

Таблица 6

**Перечень схем лекарственной терапии для оплаты медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии ЗНО (кроме лимфоидной и кроветворной тканей)**

| <b>Код схемы</b> | <b>Наименование и описание схемы</b>  | <b>Количество дней введения в тарифе</b> |
|------------------|---|--|
| <b>1</b>         | <b>2</b>  | <b>3</b>                                 |
| sh0001           | Абиратерон 1000 мг ежедневно  | 30                                       |
| sh0002           | Абиратерон 1000 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                       |
| sh0003           | Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                       |
| sh0004           | Абиратерон 1000 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)   | 28                                       |
| sh0005           | Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                       |
| sh0006           | Абиратерон 1000 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                       |
| sh0008           | Анастрозол 1 мг ежедневно   | 30                                       |
| sh0010           | Афатиниб 40 мг ежедневно  | 30                                       |
| sh0012           | Бикалутамид 150 мг ежедневно  | 30                                       |
| sh0013           | Бикалутамид 50 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                       |
| sh0014           | Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней   | 30                                       |
| sh0015           | Бикалутамид 50 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)  | 28                                       |
| sh0016           | Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                       |
| sh0017           | Бикалутамид 50 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                       |
| sh0021           | Вандетаниб 300 мг ежедневно   | 30                                       |
| sh0022           | Вемурафениб 1920 мг ежедневно   | 30                                       |
| sh0023           | Вемурафениб 1920 мг ежедневно + кобиметиниб 60 мг в 1-21-й дни  | 28                                       |
| sh0030           | Висмодегид 150 мг ежедневно   | 30                                       |
| sh0031           | Интерферон альфа-2b 20 млн МЕ/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни, 8-12-й дни, 15-19-й дни, 22-26-й дни; цикл 28 дней  | 20                                       |
| sh0046           | Гефитиниб 250 мг ежедневно  | 30                                       |
| sh0048           | Дабрафениб 300 мг ежедневно   | 30                                       |
| sh0049           | Дабрафениб 300 мг ежедневно + траметиниб 2 мг ежедневно   | 30                                       |
| sh0057           | ЕОХ: эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 21 день                     | 21                                       |
| sh0074           | DCF: доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки 24-часовая инфузия в 1-5-й дни; цикл 21 день | 5  |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0075       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день   | 4                                       |
| sh0077       | Иматиниб 800 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0078       | Интерферон альфа 6-9 млн МЕ 3 раза в неделю + бевацизумаб 10 мг/кг 1 раз в 2 недели  | 6                                       |
| sh0084.1     | Иринотекан 125 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней  | 4                                       |
| sh0094       | VeIP: ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни + винбластин 0,11 мг/кг в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день | 15                                      |
| sh0104       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0109       | Кризотиниб 500 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0110       | Лапатиниб 1250 мг ежедневно + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни каждые 3 недели  | 21                                      |
| sh0112       | Лапатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 3 недели или 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) еженедельно   | 21                                      |
| sh0114       | Ленватиниб 24 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0115       | Ленватиниб 18 мг ежедневно + эверолимус 5 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0121.1     | Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й, 15-й, 22-й дни + доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней          | 4                                       |
| sh0134       | Олапариб 800 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0135       | Пазопаниб 800 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0155       | Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии); цикл 28 дней  | 21                                      |
| sh0156       | Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней  | 21                                      |
| sh0157       | Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней   | 21                                      |
| sh0158       | Палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней  | 21                                      |
| sh0164       | Регорафениб 160 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней  | 21                                      |
| sh0165       | Сорафениб 800 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0169       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0170       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0171       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0180       | Трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день   | 14                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0202.1     | FLOX: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней  | 6                                       |
| sh0204.1     | FLOX+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней    | 6                                       |
| sh0220       | Циклофосфамид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 28 дней  | 14                                      |
| sh0221       | Циклофосфамид 50 мг ежедневно + метотрексат 5 мг 2 раза в неделю   | 30                                      |
| sh0222       | Циклофосфамид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + метотрексат 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + фторурацил 600 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 28 дней   | 14                                      |
| sh0226       | Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + винбластин 2 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + дакарбазин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней  | 4                                       |
| sh0238       | Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день   | 4                                       |
| sh0240       | Эверолимус 10 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0246       | Энзалутамид 160 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0247       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0248       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0249       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)  | 28                                      |
| sh0250       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0251       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0256       | Эрлотиниб 150 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0258       | PEI: этопозид 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0264       | Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни; цикл 21 день  | 10                                      |
| sh0275       | DCF+трастузумаб: доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 120-часовая инфузия в 1-5-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день | 5                                       |
| sh0278       | EOF+трастузумаб: оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 200 мг/м <sup>2</sup> 24-часовая инфузия в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день                                 | 21                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0279       | ЕОХ+трастузумаб: эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh0280       | ЕР: этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0290       | Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0291       | 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней   | 30                                      |
| sh0292       | Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней   | 30                                      |
| sh0293       | Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день  | 21                                      |
| sh0294       | Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0295       | Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0296       | Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0297       | Анастрозол 1 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0298       | Анастрозол 1 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0299       | Анастрозол 1 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0300       | Анастрозол 1 мг ежедневно + эверолимус 10 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0301       | Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней   | 30                                      |
| sh0302       | Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней  | 30                                      |
| sh0323       | Доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день                  | 21                                      |
| sh0324       | Доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 21 день  | 21                                      |
| sh0325       | Доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 200 мг/м <sup>2</sup> 24-часовая инфузия в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день | 21                                      |
| sh0326       | Доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 200 мг/м <sup>2</sup> 24-часовая инфузия в 1-21-й дни; цикл 21 день   | 21                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0327       | Доксорубин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день  | 21                                      |
| sh0328       | Доксорубин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 21 день  | 21                                      |
| sh0332       | Доцетаксел 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1650 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0333       | Доцетаксел 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1650 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0372       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день   | 21                                      |
| sh0373       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0374       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0375       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0389       | Фторурацил 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней  | 5                                       |
| sh0390       | Циклофосфамид 50 мг ежедневно + метотрексат 5 мг 2 раза в неделю + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день   | 21                                      |
| sh0398.1     | Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день  | 6                                       |
| sh0414       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0415       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0416       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней   | 30                                      |
| sh0419       | Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день   | 10                                      |
| sh0428       | ЕОФ: эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 200 мг/м <sup>2</sup> 24-часовая инфузия в 1-21-й дни; цикл 21 день  | 21                                      |
| sh0434       | GemCap: гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 28 дней  | 15                                      |
| sh0435       | Доксорубин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 72-часовая инфузия в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + месна 3000 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-16-й дни; цикл 21 день | 16                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0436       | HD I: ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й дни + месна 2400 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й дни + филграстим 300 мкг в 8-17-й дни; цикл 21 день   | 17                                      |
| sh0437       | HD МТХ: метотрексат 12 г/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 15 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 14 дней   | 5                                       |
| sh0438       | HD VAI: доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 72-часовая инфузия в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + месна 3000 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + винкристин 2 мг в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 21 день | 14                                      |
| sh0445       | Абиратерон 1000 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней   | 30                                      |
| sh0446       | Анастрозол 1 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) 1 раз в 21 день  | 21                                      |
| sh0447       | Анастрозол 1 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0448       | Анастрозол 1 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0449       | Анастрозол 1 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0452       | Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0453       | Бикалутамид 50 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0454       | Винкристин 1,5 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-12-й дни; цикл 21 день  | 9                                       |
| sh0463       | Доксорубицин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + цисплатин 120 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 28 дней   | 14                                      |
| sh0464       | Доксорубицин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + дакарбазин 900 мг/м <sup>2</sup> (по 225 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 28 дней                         | 14                                      |
| sh0465       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + нинтеданиб 400 мг во 2-21-й дни; цикл 21 день  | 21                                      |
| sh0467       | Иматиниб 400 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0469       | Интерферон альфа 3-5 млн МЕ 3 раза в неделю + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней  | 12                                      |
| sh0472       | Ифосфамид 1600-2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна 1920-3000 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0473       | Ифосфамид 1800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна 2160 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день  | 5                                       |
| sh0475       | Ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней + сунитиниб 37,5 мг ежедневно  | 28                                      |
| sh0476       | Ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней + эверолимус 10 мг ежедневно   | 28                                      |
| sh0482       | Ломустин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + прокарбазин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 42 дня  | 14                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0485       | Ломустин 90 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + винкристин 1,5 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + прокарбазин 70 мг/м <sup>2</sup> в 8-21-й дни; цикл 42 дня  | 15                                      |
| sh0486       | Метотрексат 50 мг в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й дни + кальция фолинат 6 мг во 2-й, 4-й, 6-й, 8-й дни; цикл 14 дней  | 8                                       |
| sh0490       | Октреотид 300 мкг ежедневно; цикл 14 дней  | 14                                      |
| sh0491       | Осимертиниб 80 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0508       | Сорафениб 400 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0509       | Сунитиниб 37,5 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0510       | Сунитиниб 37,5 мг ежедневно + октреотид 30 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0511       | Сунитиниб 50 мг в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0512       | Сунитиниб 50 мг в 1-28-й дни; цикл 42 дня  | 28                                      |
| sh0513       | Тамоксифен 20 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) 1 раз в 21 день  | 21                                      |
| sh0515       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней   | 14                                      |
| sh0516       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + октреотид 20 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней  | 14                                      |
| sh0517       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + октреотид 30 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней  | 14                                      |
| sh0518       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 28 дней  | 14                                      |
| sh0520       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + карбоплатин AUC 3 в 1-й день; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0521       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0522       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней  | 5                                       |
| sh0523       | Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0524       | Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + октреотид 20 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней  | 5                                       |
| sh0525       | Темозоломид 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + октреотид 30 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней  | 5                                       |
| sh0537       | Фторурацил 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0539       | Церитиниб 750 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0544       | Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 750 мг/м <sup>2</sup> (по 187,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 96-часовая инфузия в 1-4-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день | 4                                       |
| sh0545       | Эверолимус 10 мг ежедневно + октреотид 20 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0546       | Эверолимус 10 мг ежедневно + октреотид 30 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0551       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0561       | ГемТак: гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 300 мкг в 9-18-й дни; цикл 21 день  | 12                                      |
| sh0578       | Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-8-й дни, 15-22-й дни; цикл 28 дней   | 8                                       |
| sh0578.1     | Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-8-й дни, 15-22-й дни; цикл 28 дней   | 16                                      |
| sh0580       | Этопозид 50 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней  | 21                                      |
| sh0581       | Нинтеданиб 400 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0591       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 10-14-й дни + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг 1 раз в 14 дней; цикл 28 дней  | 14                                      |
| sh0592       | Алехтиниб 1200 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0612       | Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 5-7-й дни + доксорубицин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 9-й дни + митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 28 дней | 28                                      |
| sh0614       | Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна 1200 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + паклитаксел 120 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день                       | 15                                      |
| sh0621       | Акситиниб 10-20 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0622       | Гемцитабин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + капецитабин 1500 мг ежедневно + митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh0623       | Гемцитабин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + фторурацил 200 мг/м <sup>2</sup> ежедневно + митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 21 день  | 21                                      |
| sh0624       | Митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно   | 30                                      |
| sh0625       | Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> во 2-4-й дни + доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в 3-4-й дни + митотан в дозе, обеспечивающей его содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 28 дней       | 28                                      |
| sh0629       | Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + капецитабин 1660 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 28 дней   | 21                                      |
| sh0630       | Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) во 2-5-й дни + паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день                     | 15                                      |
| sh0650       | Капецитабин 1750-2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0652       | Капецитабин 1600-1800 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |



| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0653       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0654       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0655       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0656       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + октреотид 20 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0657       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + октреотид 30 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0658       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 дней   | 4                                       |
| sh0660       | Медроксипрогестерон 200-500 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0676       | Темозоломид 100-150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + иринотекан 250 мг/м <sup>2</sup> в 6-й день; цикл 28 дней   | 6                                       |
| sh0678       | Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250-1300 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh0679       | Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + эпирубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1250-1300 мг/м <sup>2</sup> в 1-21-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh0685       | Капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0688       | Доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 72-часовая инфузия в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + месна 3000 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-14-й дни; цикл 21 день | 14                                      |
| sh0691       | Капецитабин 2000-2500 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0692       | Тамоксифен 20-40 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0693       | Темозоломид 150-300 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0695       | Фторурацил 375-425 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0706       | Капецитабин 1600-2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0708       | Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + акситиниб 10 мг ежедневно; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh0710       | Кабозантиниб 60 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0717.1     | Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней   | 4                                       |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0718       | Винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + филграстим 5 мкг/кг в 4-10-й дни; цикл 14 дней | 9                                       |
| sh0721       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0722       | Энзалутамид 160 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0723       | Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0724       | Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0725       | Апалутамид 240 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0726       | Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0727       | Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0728       | Апалутамид 240 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0729       | Апалутамид 240 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0730       | Апалутамид 240 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0731       | Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0732       | Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней   | 30                                      |
| sh0733       | Апалутамид 240 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней   | 30                                      |
| sh0734       | Апалутамид 240 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней   | 30                                      |
| sh0735       | Апалутамид 240 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)   | 28                                      |
| sh0748       | Флутамид 750 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0749       | Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0750       | Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0751       | Флутамид 750 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0752       | Флутамид 750 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh0753       | Флутамид 750 мг ежедневно + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0754       | Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0755       | Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0756       | Флутамид 750 мг ежедневно + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 30                                      |
| sh0757       | Флутамид 750 мг ежедневно + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней  | 30                                      |
| sh0758       | Флутамид 750 мг ежедневно + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)  | 28                                      |
| sh0759       | Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh0760       | Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней  | 28                                      |
| sh0761       | Бикалутамид 50 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0762       | Апалутамид 240 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0764       | Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0765       | Карбоплатин АУС 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0773       | Карбоплатин АУС 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0774       | Карбоплатин АУС 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день   | 4                                       |
| sh0775       | Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день   | 4                                       |
| sh0776       | Карбоплатин АУС 4-5 в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней   | 4                                       |
| sh0777       | Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 2-5-й дни; цикл 28 дней   | 5                                       |
| sh0778       | Цисплатин 70-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 800-1000 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней   | 4                                       |
| sh0781       | Ифосфамид 1600 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + филграстим 5 мкг/кг; цикл 21 день | 7                                       |
| sh0782       | Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день                         | 5                                       |
| sh0783       | Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 150 мкг/м <sup>2</sup> в 9-15-й дни; цикл 21 день                  | 9                                       |
| sh0785       | Доксорубин 60 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни + дакарбазин 750 мг/м <sup>2</sup> (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день                            | 4                                       |
| sh0788       | Ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 28 дней  | 5                                       |
| sh0791       | Темозоломид 50-75 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-42-й дни; цикл 56 дней   | 42                                      |
| sh0801       | Ифосфамид 1200-1500 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (60% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 дней  | 5                                       |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0802       | Ифосфамид 1500 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> во 2-5-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) во 2-5-й дни + паклитаксел 120 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-15-й дни; цикл 21 день | 15                                      |
| sh0806       | Блеомицин 30 мг в 1-й, 8-й, 15-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день  | 7                                       |
| sh0808       | Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно  | 30                                      |
| sh0809       | Олапариб 600 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0814       | Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни; цикл 21 день  | 5                                       |
| sh0815       | Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0818       | Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день   | 10                                      |
| sh0819       | Этопозид 100 мг внутрь в 1-10-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день  | 10                                      |
| sh0829       | Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день  | 30                                      |
| sh0830       | Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день   | 30                                      |
| sh0831       | Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + метотрексат 5 мг внутрь 2 раза в неделю + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день  | 30                                      |
| sh0832       | Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + метотрексат 5 мг внутрь 2 раза в неделю + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день   | 30                                      |
| sh0848       | Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день  | 5                                       |
| sh0849       | Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0850       | Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0851       | Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + этопозид 100 мг внутрь в 1-5-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день  | 5                                       |
| sh0856       | Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0861       | Паклитаксел 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + филграстим 10 мкг/кг в 4-12-й дни; цикл 14 дней   | 12                                      |
| sh0862       | Карбоплатин AUC 8 в 1-3-й дни + этопозид 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 4-12-й дни; цикл 21 день   | 12                                      |
| sh0863       | Ленватиниб 8 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0864       | Ленватиниб 12 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0865       | Регорафениб 120 мг в 1-21-й день; цикл 28 дней  | 21                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0868.1     | Карбоплатин АUC 5 в/в в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день   | 6                                       |
| sh0870       | Фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день  | 4                                       |
| sh0875       | Доксорубицин 90 мг/м <sup>2</sup> (по 22,5 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цисплатин 120 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 28 дней   | 4                                       |
| sh0879       | Цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 800 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) в 1-5-й дни; цикл 21 дней  | 5                                       |
| sh0880.1     | Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней  | 6                                       |
| sh0882.1     | Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й, 15-16-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней | 4                                       |
| sh0887       | Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0889       | Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 5 мкг/кг в 9-19-й дни; цикл 21 день  | 13                                      |
| sh0890       | Гемцитабин 900 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день + филграстим 5 мкг/кг в 9-15-й дни; цикл 21 день  | 9                                       |
| sh0893       | Доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> (по 25 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-4-й дни + месна 2500 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + филграстим 300 мкг в 5-16-й дни; цикл 21 день  | 16                                      |
| sh0894       | Ифосфамид 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й дни + месна (100% от дозы ифосфамида) в 1-7-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 8-16-й дни; цикл 21 день   | 16                                      |
| sh0895       | Ифосфамид 1800 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + месна 2160 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 14 дней  | 5                                       |
| sh0896       | Ифосфамид 1800 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + месна 2160 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-5-й дни; цикл 28 дней  | 5                                       |
| sh0909.1     | Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в/в в 8-й, 22-й дни + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (24-часовая инфузия) в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 43 дня   | 4                                       |
| sh0914       | Винкристин 2 мг в/в в 1-й день + доксорубицин 37,5 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-2-й дни + циклофосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 300 мкг в 5-12-й дни; 14 дней   | 10                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0917       | Иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 825 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0918       | Иринотекан 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0919       | Иринотекан 180-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 825 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0920       | Иринотекан 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0921       | Оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 1650 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день  | 14                                      |
| sh0924       | Дабрафениб 300 мг внутрь ежедневно + траметиниб 2 мг внутрь ежедневно + панитумумаб 6 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней   | 14                                      |
| sh0925       | Дазатиниб 140 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0926.1     | Деносумаб 120 мг п/к в 1-й, 8-й, 15-й, 28-й дни первого месяца, затем 1 раз в 28 дней  | 4                                       |
| sh0930       | Доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + блеомицин 30 мг в/в в 1-5-й дни + цисплатин в 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + трастузумаб 4 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 21 день                                    | 5                                       |
| sh0931       | Доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + блеомицин 30 мг в/в в 1-5-й дни + цисплатин в 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день  | 5                                       |
| sh0936       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день                                 | 4                                       |
| sh0937       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3750 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 120-часовая инфузия в 1-5-й дни + филграстим 5 мкг/кг в 6-12-й дни; цикл 21 день | 12                                      |
| sh0942       | Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 14-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни + вемурафениб 1920 мг ежедневно; цикл 28 дней   | 27                                      |
| sh0943       | Ифосфамид 2800 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + месна (120% от дозы ифосфамида) в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0944       | Капецитабин 1250 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0945       | Нилотиниб 800 мг внутрь ежедневно  | 30                                      |
| sh0946       | Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день                                | 4                                       |
| sh0947       | Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2500 мг/м <sup>2</sup> (по 500 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (120-часовая инфузия) во 2-6-й дни; цикл 21 день                              | 6                                       |
| sh0948       | Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3000-4000 мг/м <sup>2</sup> (по 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 21 день                       | 4                                       |
| sh0955       | Регорафениб 80 мг внутрь в 1-7-й дни, 120 мг внутрь в 8-14-й дни, 160 мг внутрь в 15-21-й дни; цикл 28 дней  | 21                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh0956       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + иринотекан 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0957       | Темозоломид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + иринотекан 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни; цикл 21 день   | 5                                       |
| sh0958       | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й, 15-21-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 8-й, 22-й дни; цикл 28 дней  | 8                                       |
| sh0958.1     | Темозоломид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-7-й, 15-21-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 8-й, 22-й дни; цикл 28 дней  | 16                                      |
| sh0959       | Кабозантиниб 140 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh0960       | Церитиниб 450 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0966       | Фторурацил 4000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в/в в 1-4-й дни + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в во 2-й день; цикл 21 день | 4                                       |
| sh0970       | Цисплатин 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни + этопозид 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-4-й дни; цикл 21 день                       | 4                                       |
| sh0973       | Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> внутрь в 1-14-й дни; цикл 28 дней  | 14                                      |
| sh0974       | Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3000 мг/м <sup>2</sup> (по 750 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (96-часовая инфузия) в 1-4-й дни; цикл 28 дней           | 4                                       |
| sh0975       | Цисплатин 75-100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 5000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) в/в в 1-5-й дни; цикл 21 день                   | 5                                       |
| sh0978       | Этопозид 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-5-й дни + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 28 дней   | 6                                       |
| sh0980       | Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии); цикл 28 дней  | 28                                      |
| sh0981       | Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + кейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней              | 28                                      |
| sh0982       | Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней                 | 28                                      |
| sh0983       | Абемациклиб 300 мг ежедневно + фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 28 дней                | 28                                      |
| sh0984       | Абемациклиб 300 мг ежедневно + анастрозол 1 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0985       | Абемациклиб 400 мг ежедневно  | 30                                      |
| sh0986       | Фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней                                       | 21                                      |
| sh0987       | Иксабепилон 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |
| sh0988       | Иксабепилон 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м <sup>2</sup> в 1-14-й дни; цикл 21 день   | 14                                      |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh0989       | Гемцитабин 800-1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + капецитабин 1600-2000 мг/м <sup>2</sup> 1-14-й дни + митотан в дозе, обеспечивающей содержание в сыворотке крови на уровне 14-20 мкг/мл ежедневно; цикл 21 день | 21                                      |
| sh0990       | Доксорубин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 14 дней  | 10                                      |
| sh0992       | Эпирубицин 90-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 14 дней  | 10                                      |
| sh0994       | Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 14 дней   | 10                                      |
| sh0997       | Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 14 дней   | 10                                      |
| sh1000       | Трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней + анастрозол 1 мг внутрь ежедневно   | 28                                      |
| sh1001       | Трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней + тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно  | 28                                      |
| sh1004       | Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней+ трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней   | 21                                      |
| sh1005       | Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней   | 21                                      |
| sh1006       | Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней  | 21                                      |
| sh1007       | Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней  | 21                                      |
| sh1008       | Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 21                                      |
| sh1009       | Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh1010       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней   | 28                                      |
| sh1011       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней   | 28                                      |
| sh1012       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh1013       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней   | 28                                      |



| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы   | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3                                       |
| sh1014       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                                | 28                                      |
| sh1015       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + палбоциклиб 125 мг в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                              | 28                                      |
| sh1016       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней                           | 28                                      |
| sh1017       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                        | 28                                      |
| sh1018       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                          | 28                                      |
| sh1019       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + рибоциклиб 600 мг внутрь в 1-21-й дни; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                        | 28                                      |
| sh1020       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней                             | 28                                      |
| sh1021       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                          | 28                                      |
| sh1022       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                            | 28                                      |
| sh1023       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + абемациклиб 300 мг внутрь ежедневно; цикл 28 дней + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней                          | 28                                      |
| sh1024       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + эверолимус 10 мг внутрь ежедневно + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh1025       | Медроксипрогестерон 500-1000 мг внутрь ежедневно  | 30                                      |
| sh1026       | Медроксипрогестерон 500-1000 мг внутрь ежедневно + гозерелин 3,6 мг п/к 1 раз в 28 дней   | 28                                      |
| sh1027       | Медроксипрогестерон 500-1000 мг внутрь ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh1028       | Медроксипрогестерон 500-1000 мг внутрь ежедневно + бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh1029       | Медроксипрогестерон 500-1000 мг внутрь ежедневно + трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней  | 28                                      |
| sh1037       | Этопозид 100 мг внутрь в 1-14-й дни; цикл 28 дней   | 14                                      |
| sh1042       | Циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно + метотрексат 5 мг внутрь в 1-2-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 7 дней | 7                                       |
| sh1043       | Этопозид 50 мг внутрь в 1-20-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней                                    | 22                                      |
| sh1044       | Этопозид 50 мг внутрь в 1-20-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в 1 раз в 21 день; цикл 28 дней                                   | 21/20/20**                              |

| Код<br>схемы | Наименование и описание схемы  | Количество дней<br>введения в<br>тарифе |
|--------------|--|---|
| 1            | 2  | 3                                       |
| sh1045       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней   | 21                                      |
| sh1046       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + лапатиниб 1500 мг ежедневно   | 30                                      |
| sh1047       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + лапатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh1048       | Анастрозол 1 мг внутрь ежедневно + лапатиниб 1000 мг ежедневно + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 21 день   | 21                                      |
| sh1049       | Тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней  | 21                                      |
| sh1050       | Трипторелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней + тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в 1 раз в 21 день   | 28                                      |
| sh1051       | Тамоксифен 20 мг внутрь ежедневно + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в/в 1 раз в 21 день  | 21                                      |
| sh1052       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 21 день  | 10                                      |
| sh1054       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 21 день  | 10                                      |
| sh1057       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + карбоплатин АУС 6 в/в в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 21 день  | 10                                      |
| sh1059       | Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + карбоплатин АУС 6 в/в в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в/в в 1-й день + филграстим 5 мкг/кг п/к во 2-10-й дни; цикл 21 день | 10                                      |

\* Количество дней введения указано в формате А/В/С, где:

А – количество дней, за которые осуществляется оплата при первой госпитализации в рамках одного цикла;

В – количество дней, за которые осуществляется оплата при второй госпитализации в рамках одного цикла;

С (при наличии) – количество дней, за которые осуществляется оплата при третьей госпитализации в рамках одного цикла.