

**Перечень схем лекарственной терапии для оплаты медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) при количестве дней введения в тарифе 3 дня и менее**

<b>Код схемы</b>	<b>Наименование и описание схемы</b>	<b>Количество дней введения в тарифе</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
sh0011	Бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0019	Бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0024	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0024.1	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0025	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh0025.1	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh0027	Винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0027.1	Винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0028	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0028.1	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0042	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh0042.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	2
sh0047	Гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0050	Дакарбазин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0052	Дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии)	1
sh0058	Доксорубицин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл: 14 дней или 21 день	1
sh0061	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0062	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0063	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии); цикл 21 день	1
sh0066	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0067	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0068	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0069	Доцетаксел 75-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0070	Доцетаксел 75-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0071	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 2 введения в тарифе
1	2	3
sh0072	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0076	Иксабепилон 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0081	Ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0083	Иринотекан 250-350 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0084	Иринотекан 125 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	1
sh0085	Иринотекан 250-350 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0087	Иринотекан 150-180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0088	Иринотекан 150-180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	1
sh0090	Иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0090.1	Иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	3
sh0096	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0113	Лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0121	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> во 2-й, 15-й, 22-й дни + доксорубин 30 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней	2/1/1**
sh0123	Митомицин 40 мг внутривенно, первая инстиляция в день выполнения трансуретральной резекции (ТУР), далее 1 раз в неделю	1
sh0124	Митомицин 7,5 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 42 дня	1
sh0128	Оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0130	FOLFOX 4: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-2-й дни + фторурацил 1200 мг/м <sup>2</sup> (по 600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 22-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0139	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh0139.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh0140	TGO: паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + гемцитабин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0140.1	TGO: паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + гемцитабин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0144	Паклитаксел 60-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 2 в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0149	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0150	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0153	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> внутривенно во 2-й день + паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> внутривенно в 8-й день; цикл 21 день	2/1**
sh0153.1	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> внутривенно во 2-й день + паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> внутривенно в 8-й день; цикл 21 день	3
sh0159	Панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0160	Пембролизумаб 2 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0161	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0162	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>3</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0163	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0179	Трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0181	Трастузумаб эмтанзин 3,6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0182	Трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0191	De Gramont: кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0195	De Gramont+бевацизумаб: кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0202	FLOX: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней	1
sh0204	FLOX+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней	1
sh0206	FOLFOXIRI: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 165 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м <sup>2</sup> (по 1600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0207	FOLFOXIRI+бевацизумаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 165 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м <sup>2</sup> (по 1600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0208	FOLFOXIRI+панитумумаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 165 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м <sup>2</sup> (по 1600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0209	FOLFOXIRI+цетуксимаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 165 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м <sup>2</sup> (по 1600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh0209.1	FOLFOXIRI+цетуксимаб: оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 165 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м <sup>2</sup> (по 1600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3
sh0214	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии)	1
sh0215	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0216	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0217	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0218	Цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й день; цикл 7 дней	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>4</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0224	Цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0229	Цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0253	Эпирубицин 60-90 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0255	Эрибулин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0255.1	Эрибулин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0272	Гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней	1
sh0306	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0306.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0308	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0308.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0311	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день каждые 3 недели; цикл 28 дней	1
sh0330	Пегилированный липосомальный доксорубицин 40-50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0331	Доксорубицин 50-60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0335	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0336	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0338	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0339	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней; цикл 21 день	1
sh0341	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0343	Иксабепилон 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0347	Карбоплатин AUC 6-7 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0348	Лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней	1
sh0349	Лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней	1
sh0350	Лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0368	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 2 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 7 дней	1
sh0371	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0371.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 6 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0385	Трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0399	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1
sh0399.1	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 5 введения в тарифе
1	2	3
sh0418	Эрибулин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0418.1	Эрибулин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0426	De Gramont+панитумумаб: кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0450	Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0466	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0474	Ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней	1
sh0493	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh0494	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0497	Паклитаксел 175-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0499	Паклитаксел 175-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0504	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0506	Рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0533	Трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0534	Трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	1
sh0538	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) 1 раз в 21 день	1
sh0555	Этопозид 100-120 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + карбоплатин AUC 4-6 в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0556	Этопозид 120 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + цисплатин 60-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0557	De Gramont+цетуксимаб: кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh0557.1	De Gramont+цетуксимаб: кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3
sh0564	Винорелбин 60-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0564.1	Винорелбин 60-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0575	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh0575.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней в введении в тарифе
1	2	3
sh0576	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0576.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в 1-й день + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0582	Метотрексат 30-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0583	Ниволумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0588	Фторурацил 2600 мг/м <sup>2</sup> 24-часовая инфузия в 1-й день + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доцетаксел 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0589	Фторурацил 2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 48-часовая инфузия в 1-2-й дни + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доцетаксел 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0595	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0596	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0597	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0601	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0604	Ниволумаб 1 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 3 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0605	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 6 во 2-й день внутривенно + паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день внутривенно; цикл 21 день	2/1**
sh0605.1	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 6 во 2-й день внутривенно + паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 8-й день внутривенно; цикл 21 день	3
sh0616	Винорелбин 25-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0617	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + октреотид 30 мг 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	2
sh0618	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0620	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh0620.1	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3
sh0628	Оксалиплатин 60-85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 165-180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 320-400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 7 введения в тарифе
1	2	3
sh0632	Гемцитабин 750-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0632.1	Гемцитабин 750-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0634	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 3-6 в 1-й или 2-й день; цикл 21 день	1(2)/1**,***
sh0634.1	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 3-6 в 1-й или 2-й день; цикл 21 день	2(3)***
sh0635	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0635.1	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0636	Гемцитабин 1000-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 25-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0636.1	Гемцитабин 1000-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 25-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0638	Гемцитабин 1000-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0638.1	Гемцитабин 1000-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0639	Доксорубицин 50-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0640	Доксорубицин 30-50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0641	Доксорубицин 30-60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 40-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0643	Доцетаксел 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0644	Доцетаксел 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0645	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1
sh0645.1	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3
sh0646	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0647	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + афлиберцепт 4 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0648	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в струйно в 1-й день + фторурацил 2000-2600 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0661	Ниволумаб 240 мг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0662	Ниволумаб 480 мг в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0663	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200-400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 8 введения в тарифе
1	2	3
sh0664	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200-400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0665	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200-400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + ланреотид 120 мг 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	2
sh0668	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200-400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + панитумумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0670	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200-400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh0670.1	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200-400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) 46-часовая инфузия в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3
sh0671	Паклитаксел 135-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0672	Паклитаксел 175-225 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-7 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0673	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0673.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0675	Паклитаксел 175-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0677	Циклофосфамид 600-1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + винкристин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0689	Иринотекан 70-90 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 3-й дни + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни; цикл 14 дней	3
sh0690	Кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0696	Доксорубин 30-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0697	Доксорубин 30-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0698	Иринотекан 150-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0699	Пегилированный липосомальный доксорубин 20-30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0700	Паклитаксел 30-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0701	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0702	Иринотекан 60-65 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0702.1	Иринотекан 60-65 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 60-75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>9</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0704	Гемцитабин 750-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 25-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0704.1	Гемцитабин 750-1250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 25-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2
sh0705	Доцетаксел 60-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0707	Карбоплатин АУС 4-7 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0709	Ниволумаб 3 мг/кг в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0711	Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ 50–100 мг в 1-й день; еженедельно или цикл 30 дней или 3 еженедельные инстиляции каждые 3, 6, 12, 18, 24, 30, 36 месяца	1
sh0712	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0712.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	3
sh0714	Атезолизумаб 840 мг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0715	Атезолизумаб 1680 мг в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0716	Митомицин 40 мг в 1-й день; цикл 30 дней	1
sh0717	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 28 дней	2/1/1**
sh0719	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0720	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0736	Лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней	1
sh0737	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гозерелин 3,6 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0738	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0739	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0740	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0741	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh0742	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гозерелин 10,8 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0743	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0744	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0745	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + трипторелин 11,25 мг 1 раз в 90 дней; цикл 21 день	1
sh0746	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + лейпрорелин 45 мг 1 раз в 180 дней; цикл 21 день	1
sh0747	Кабазитаксел 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + дегареликс 80 мг 1 раз в 28 дней (240 мг в первый месяц терапии); цикл 21 день	1
sh0763	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + карбоплатин АУС 4-5 в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0766	Цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> (начальная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0767	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 50 мг в 1-й день; цикл 28 дней	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0768	Паклитаксел 135 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0769	Авелумаб 800 мг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0770	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + винбластин 4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 21 день	2/1**
sh0770.1	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + винбластин 4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 21 день	3
sh0771	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 5000 мг/м <sup>2</sup> (24-часовая инфузия) в 1-й день + месна 5000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0772	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + ифосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день; цикл 28 дней	3
sh0779	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 21 день	2/1**
sh0779.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> во 2-й день; цикл 21 день	3
sh0780	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 4-5 во 2-й день; цикл 21 день	2/1**
sh0780.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + карбоплатин АUC 4-5 во 2-й день; цикл 21 день	3
sh0786	Гемцитабин 1800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + дакарбазин 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0787	Гемцитабин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0787.1	Гемцитабин 800 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0790	Дакарбазин 1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0793	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0794	Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ 360 мг еженедельно	1
sh0795	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0795.1	Метотрексат 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + винбластин 3 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 22-й дни + карбоплатин АUC 4-5 в 1-й день; цикл 28 дней	3
sh0796	Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день + паклитаксел 175-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин АUC 6 в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0797	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0797.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0798	Паклитаксел 170 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0799	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0800	Иринотекан 125 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh0800.1	Иринотекан 125 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh0803	Циклофосфамид 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + доксорубицин 45 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh0807	Ломустин 130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 42 дня	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>1</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0810	Карбоплатин AUC 5 в 1-й день + пегилированный липосомальный доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0811	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0811.1	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0816	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 30-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0817	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в болюсно в 1-й день + фторурацил 1200 мг/м <sup>2</sup> (по 600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (22-часовая инфузия) в 1-2-й дни; цикл 21 день	2
sh0820	Винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0820.1	Винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0821	Винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0821.1	Винорелбин 25 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0822	Пегилированный липосомальный доксорубицин 40-50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh0823	Пегилированный липосомальный доксорубицин 40-50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh0824	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 7 дней	1
sh0825	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 7 дней	1
sh0826	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0827	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0828	Пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0833	Карбоплатин AUC 5 в 1-й день + пегилированный липосомальный доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh0834	Карбоплатин AUC 5 в 1-й день + пегилированный липосомальный доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh0835	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0835.1	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	3
sh0836	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0836.1	Паклитаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	3
sh0837	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0837.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	3
sh0838	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней введения в тарифе
1	2	3
sh0838.1	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	3
sh0839	Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0840	Карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день + доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0841	Карбоплатин AUC 4 в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0841.1	Карбоплатин AUC 4 в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0842	Карбоплатин AUC 4 в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0842.1	Карбоплатин AUC 4 в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0852	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 30-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0853	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 30-40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0854	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0854.1	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0855	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh0855.1	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0857	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh0858	Цисплатин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + иринотекан 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh0859	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в болюсно в 1-й день + фторурацил 1200 мг/м <sup>2</sup> (по 600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (22-часовая инфузия) в 1-2-й дни + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0860	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в болюсно в 1-й день + фторурацил 1200 мг/м <sup>2</sup> (по 600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (22-часовая инфузия) в 1-2-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	2
sh0866	Карбоплатин AUC 2,5 в/в в 1-й день + паклитаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в/в в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0867	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0869	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доцетаксел 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0871	Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 28 дней	3
sh0872	Дурвалумаб 10 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0873	Цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + винкристин 0,6 мг/м <sup>2</sup> в 3-й день + циклофосфамид 700 мг/м <sup>2</sup> в 4-й день; цикл 21 день	3
sh0874	Доксорубицин 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + ифосфамид 2500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + месна 2250 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни; цикл 21 день	3

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>3</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0876	Пембролизумаб 400 мг в/в в 1-й день; цикл 42 дня	1
sh0877	Пролголимаб 1 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0878	Циклофосфамид 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + винкристин 1,5 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0880	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни; цикл 49 дней	1
sh0881	Цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0882	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 15-й дни + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й, 15-16-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	2
sh0883	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0884	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 250 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2200 мг/м <sup>2</sup> (по 1100 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (48-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0885	Оксалиплатин 60-85 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + иринотекан 120-180 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2000-2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1000-1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0886	Иринотекан 165 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 3200 мг/м <sup>2</sup> (по 1600 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0888	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0888.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни + оксалиплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0891	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0891.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0892	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0892.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0897	Доксорубицин 60 мг/м <sup>2</sup> (по 20 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + ифосфамид 6000 мг/м <sup>2</sup> (по 2000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в/в в 1-3-й дни + месна (100-120% от дозы ифосфамида) в 1-3-й дни + дакарбазин 900 мг/м <sup>2</sup> (по 300 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (72-часовая инфузия) в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh0898	Доцетаксел 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (48-часовая инфузия) в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>4</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0899	Цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + доцетаксел 40 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0900	Доцетаксел 40 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + цисплатин 40 мг/м <sup>2</sup> в/в в 3-й день + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (по 1000 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (48-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни; цикл 14 дней	3
sh0905	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0906	Кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2/1**
sh0906.1	Кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	3
sh0907	Кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0908	Кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh0909	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в/в в 8-й, 22-й дни + кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни + фторурацил 2000 мг/м <sup>2</sup> (24-часовая инфузия) в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 43 дня	1
sh0912	Трастузумаб 4 мг/кг (нагрузочная доза 6 мг/кг) в 1-й день + иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0913	Трастузумаб 4 мг/кг (нагрузочная доза 6 мг/кг) в 1-й день + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни; цикл 14 дней	2
sh0915	Винкристин 2 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + доксорубицин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + циклофосфамид 1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0922	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + оксалиплатин 85-100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0923	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0926	Деносумаб 120 мг п/к в 1-й, 8-й, 15-й, 28-й дни первого месяца, затем 1 раз в 28 дней	1
sh0927	Доксорубицин 20 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0929	Доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh0929.1	Доксорубицин 30 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + цисплатин 50 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh0933	Доцетаксел 20 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 20 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 7 дней	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>5</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh0934	Доцетаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0935	Доцетаксел 60 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + доксорубицин 60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0940	Иринотекан 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh0940.1	Иринотекан 150 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	2
sh0941	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0949	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + карбоплатин AUC 5,5 в/в в 1-й день + трастузумаб 4 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0950	Паклитаксел 45-50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 1,5-2 в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0951	Паклитаксел 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 2 в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	1
sh0951.1	Паклитаксел 50 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 2 в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3
sh0954	Пембролизумаб 200 мг в 1-й день + паклитаксел 200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0961	Атезолизумаб 1200 мг в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0962	Ниволумаб 3 мг/кг в/в в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг в/в 1 раз в 42 дня; цикл 14 дней	1
sh0963	Трастузумаб 4 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0964	Трастузумаб 4 мг/кг в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0965	Трастузумаб 6 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0967	Цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	1
sh0967.1	Цетуксимаб 250 мг/м <sup>2</sup> (нагрузочная доза 400 мг/м <sup>2</sup> ) в 1-й, 8-й дни; цикл 14 дней	2
sh0969	Цетуксимаб 500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh0971	Цисплатин 25 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 7 дней	1
sh0972	Цисплатин 50-60 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + доксорубицин 50 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh0976	Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + карбоплатин AUC 5 в 1-й день + атезолизумаб 1200 мг в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0977	Этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	3
sh0979	Ниволумаб 360 мг в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг 1 раз в 6 недель; цикл 21 день	1
sh0995	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + эмпагфилграстим 7,5 мг п/к во 2-й день; цикл 14 дней	2
sh0996	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh0999	Паклитаксел 175 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 14 дней	1
sh1002	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + карбоплатин AUC 6 в/в 1 раз в 21 день; цикл 7 дней	1
sh1003	Фулвестрант 500 мг 1 раз в 28 дней (500 мг 2 раза в первый месяц терапии) + трипторелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней в введении в тарифе
1	2	3
sh1031	Паклитаксел 90 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh1031.1	Паклитаксел 90 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh1032	Паклитаксел 90 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1032.1	Паклитаксел 90 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 21 день	3
sh1033	Паклитаксел 90 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 10 мг/кг в/в в 1-й, 15-й дни каждые 28 дней; цикл 21 день	1
sh1033.1	Паклитаксел 90 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + бевацизумаб 10 мг/кг в/в в 1-й, 15-й дни каждые 28 дней; цикл 21 день	3
sh1035	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + карбоплатин AUC 2 в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh1035.1	Гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + карбоплатин AUC 2 в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh1036	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1038	Паклитаксел 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + карбоплатин AUC 2 в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	1
sh1040	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 21 день	1
sh1040.1	Доцетаксел 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 21 день	3
sh1041	Гемцитабин 800-1200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + трастузумаб 2 мг/кг (нагрузочная доза 4 мг/кг) в/в 1 раз в 7 дней; цикл 28 дней	1
sh1056	Эпирубицин 90-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	1
sh1061	Ниволумаб 360 мг в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг 1 раз в 6 недель + пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-6 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1062	Ниволумаб 360 мг в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг 1 раз в 6 недель + пеметрексед 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1063	Ниволумаб 360 мг в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг 1 раз в 6 недель + паклитаксел 175-225 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + карбоплатин AUC 5-7 в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1066	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни + иринотекан 125-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh1066.1	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни + иринотекан 125-200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	2
sh1067	Гемцитабин 750-1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh1067.1	Гемцитабин 750-1200 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh1068	Эпирубицин 60-120 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + циклофосфамид 600 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1074	Доксорубицин 25 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh1075	Оксалиплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1075.1	Оксалиплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	2/2/3/2**
sh1076	Оксалиплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	1
sh1077	Доцетаксел 70 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + цисплатин 70 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней 7 введения в тарифе
1	2	3
sh1078	Циклофосфамид 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + доксорубин 50 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + винкристин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1079	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1079.1	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	2/2/3/2**
sh1081	Карбоплатин АUC 5 в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**
sh1082	Метотрексат 3000-8000 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1084	Ниволумаб 240 мг в 1-й день + ипилимумаб 1 мг/кг 1 раз в 6 недель; цикл 14 дней	1
sh1085	Кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh1088	Циклофосфамид 750 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + дакарбазин 600 мг/м <sup>2</sup> в 1-2-й дни + винкристин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	2
sh1097	Иринотекан 180 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	2
sh1099	Этопозид 80-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + карбоплатин АUC 5-6 в 1-й день + дурвалумаб 1500 мг в 1-й день; цикл 21 день	3
sh1101	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh1101.1	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	2
sh1108	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh1109	Цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh1112	Ифосфамид 3000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + месна 4500 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни; цикл 21 день	3
sh1113	Ниволумаб 240 мг в 1-й день + оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh1116	Карбоплатин АUC 5 в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	1
sh1116.1	Карбоплатин АUC 5 в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни; цикл 21 день	2
sh1124	Интерферон альфа-2b 3 млн.МЕ 3 раза в неделю	3
sh1125	Интерферон альфа-2b 5 млн.МЕ 3 раза в неделю	3
sh1127	Кальция фолинат 200 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки) (46-часовая инфузия) в 1-2-й дни + панитумумаб 6 мг/кг в/в в 1-й день; цикл 14 дней	2
sh1129	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 15-й, 29-й дни + кальция фолинат 250 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + фторурацил 500 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й, 29-й, 36-й дни + бевацизумаб 5 мг/кг в/в 1 раз в 14 дней; цикл 49 дней	1
sh1130	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**
sh1131	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>8</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh1132	Цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**
sh1134	Дурвалумаб 1500 мг в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh1136	Карбоплатин АУС 5 в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1136.1	Карбоплатин АУС 5 в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + ланреотид 120 мг п/к 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	2/2/3/2**
sh1139	Этопозид 80-100 мг/м <sup>2</sup> в 1-3-й дни + цисплатин 75-80 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + дурвалумаб 1500 мг в 1-й день; цикл 21 день	3
sh1143	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й дни + ломустин 40 мг/м <sup>2</sup> в 1-й, 8-й, 15-й, 22-й дни; цикл 28 дней	1
sh1144	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й, 29-й дни + ломустин 90 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 42 дня	1
sh1144.1	Бевацизумаб 5-10 мг/кг в 1-й, 15-й, 29-й дни + ломустин 90 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 42 дня	3
sh1147	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + паклитаксел+[альбумин] 100-125 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh1147.1	Гемцитабин 750-1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + паклитаксел+[альбумин] 100-125 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh1148	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 840 мг в/в в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	1
sh1148.1	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 840 мг в/в в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней	3
sh1149	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 1200 мг в/в 1 раз в 21 день; цикл 28 дней	1
sh1150	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 1680 мг в/в в 1-й день; цикл 28 дней	1
sh1150.1	Паклитаксел+[альбумин] 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й, 15-й дни + атезолизумаб 1680 мг в/в в 1-й день; цикл 28 дней	3
sh1151	Паклитаксел+[альбумин] 260 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1153	Карбоплатин АУС 5 в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1153.1	Карбоплатин АУС 5 в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	2/2/3/2**
sh1154	Карбоплатин АУС 5 в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**
sh1155	Оксалиплатин 85 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + кальция фолинат 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 400 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + фторурацил 2400 мг/м <sup>2</sup> (по 1200 мг/м <sup>2</sup> в сутки)(46-часовая инфузия) в/в в 1-2-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	2
sh1157	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1157.1	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + иринотекан 65 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	2/2/3/2**
sh1159	Циклофосфамид 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + доксорубин 50 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + винкристин 1,4 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1161	Цисплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + октреотид 20-40 мг 1 в/м раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**
sh1162	Цисплатин 75 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + октреотид 20-40 мг 1 в/м раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**

Код схемы	Наименование и описание схемы	Количество дней <sup>9</sup> введения в тарифе
1	2	3
sh1163	Цисплатин 80 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + этопозид 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-3-й дни + октреотид 20-40 мг 1 в/м раз в 28 дней; цикл 21 день	3/3/1/3/1/3**
sh1164	Оксалиплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1
sh1164.1	Оксалиплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й, 8-й дни + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	2/2/3/2**
sh1165	Оксалиплатин 100 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + гемцитабин 1000 мг/м <sup>2</sup> в/в в 1-й день + октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней; цикл 14 дней	1
sh1167	Октреотид 20-40 мг в/м 1 раз в 28 дней	1
sh1172	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + пегилированный липосомальный доксорубин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день; цикл 21 день	1
sh1173	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + пегилированный липосомальный доксорубин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 7,5 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1
sh1174	Оксалиплатин 100-130 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + пегилированный липосомальный доксорубин 30 мг/м <sup>2</sup> в 1-й день + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	1

\*\* Для отдельных схем лечения количество дней введения указано в формате A1/.../An, где An – количество дней, за которые осуществляется оплата при n-ой госпитализации в рамках режима применения схемы лекарственной терапии.

\*\*\* Для отдельных схем лечения количество дней введения указано в формате A(B), где A и B – количество дней, за которые осуществляется оплата при госпитализации, при этом описанием схемы предполагается наличие выбора дня введения, что влияет на количество дней введения в тарифе.